

Translation et vecteurs, cours, première STD 2A

F.Gaudon

17 avril 2011

Table des matières

1 Vecteurs et translation du plan	2
2 Repérage dans le plan	3
3 Propriétés des translations	4

1 Vecteurs et translation du plan

Définition :


Soient A et B deux points du plan. On appelle translation de vecteurs \vec{AB} l'application qui à tout point M du plan associe le point M' tel que les segments $[AM']$ et $[BM]$ ont le même milieu. On dit alors que les vecteurs \vec{AB} et $\vec{MM'}$ sont égaux et on note $\vec{AB} = \vec{MM'}$. M' est appelé l'image de M par la translation de vecteur \vec{u} .

Propriété :

A, B, M et M' quatre points du plan. $\vec{AB} = \vec{MM'}$ si et seulement si $ABMM'$ est un parallélogramme.

Remarque :

Deux vecteurs \vec{u} et \vec{v} sont égaux si et seulement si ils ont même direction, même sens et même longueur.



Définition :

On appelle *norme* d'un vecteur \vec{u} et on note $\|\vec{u}\|$ sa longueur. C'est à dire, si A et B sont deux points tels que $\vec{AB} = \vec{u}$ alors $\|\vec{u}\| = AB$.

Propriété :

Pour tout point A du plan et pour tout vecteur \vec{u} , il existe un unique point B tel que $\vec{AB} = \vec{u}$.


Définition :

Deux vecteurs \vec{u} et \vec{v} du plan sont dits colinéaires si il existe un réel k non nul tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Propriété :

Soient A, B, C et D quatre points distincts du plan.

- A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs \vec{AB} et \vec{AC} sont colinéaires.
- Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si les vecteurs \vec{AB} et \vec{CD} sont colinéaires.




2 Repérage dans le plan

Définition :

Un repère du plan est la donnée d'un point origine O et de deux vecteurs \vec{i}, \vec{j} non colinéaires. On note alors $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ ce repère.

Propriété et définition :

Soit $(O; \vec{i}; \vec{j})$ un repère du plan. Pour tout point M , il existe un unique couple $(x; y)$ appelé coordonnées du point M de réels tels que $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$.
 x est l'abscisse, y est l'ordonnée du point M dans ce repère.



Propriété :

Soit $(O; \vec{i}; \vec{j})$ un repère du plan, $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points. Alors :

- Le vecteur \vec{AB} a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$;
- le milieu du segment $[AB]$ a pour coordonnées $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$;

Propriété :

Soit $(O; \vec{i}; \vec{j})$ un repère orthonormé du plan (c'est à dire que les axes sont deux à deux perpendiculaires et les vecteurs \vec{i}, \vec{j} ont une norme égale à 1).

- Le vecteur \vec{u} de coordonnées $(a; b)$ a pour norme $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$;
- Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points. La distance AB de A à B est donnée par :

$$AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

3 Propriétés des translations

Propriété :

Si M' et N' sont les images respectives de M et N par une translation, alors $\vec{M'N'} = \vec{MN}$.

Preuve :

On a en effet $\vec{MM'} = \vec{u}$ et $\vec{NN'} = \vec{u}$ où \vec{u} est le vecteur définissant la translation donc $\vec{M'N'} = \vec{M'M} + \vec{MN} + \vec{NN'} = -\vec{u} + \vec{MN} + \vec{u} = \vec{MN}$.

Propriété :

Les translations conservent :

- l'alignement ;
- les milieux de segments ;

Preuve :

- Si M , N et P sont trois points alignés d'images respectives M' , N' et P' , les vecteurs \vec{MN} et \vec{MP} sont colinéaires donc il existe un réel a tel que $\vec{MP} = a\vec{MN}$. D'après ce qui précède, on a $\vec{M'P'} = \vec{MP}$ et $\vec{M'N'} = \vec{MN}$. On a donc $\vec{M'P'} = a\vec{M'N'}$ ce qui montre que M' , N' et P' sont alignés.
- Même raisonnement.

Propriétés :

- L'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle.
- L'image d'un segment $[AB]$ par une translation est un segment d'extrémités les images de A et B ;

Preuve :

Si M et N sont deux points et M' et N' sont leurs images respectives, on a vu que $\vec{M'N'} = \vec{MN}$. Cela signifie donc \vec{MN} et $\vec{M'N'}$ sont colinéaires et donc que les droites (MN) et $(M'N')$ sont parallèles.

Propriété :

Une translation conserve les longueurs, les aires et les volumes.

Preuve :

Montrons ce qui concerne les longueurs. On a vu que si M' et N' sont les images de M et N par une translation, on a $\vec{M'N'} = \vec{MN}$ donc en passant aux longueurs, on a $M'N' = MN$.

Propriété :

L'image d'un cercle de centre I et de rayon R où R est un réel positif par une translation est un cercle de centre l'image de I et de rayon R .